



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



QUÍMICA

Tema: FUNCIONES OXIGENADAS
Docente: Artemio Chávez Salas

academiacesarvallejo.edu.pe

I. OBJETIVOS

Los estudiantes, al término de la sesión de clases serán capaces de:

1. **Identificar y clasificar** los compuestos oxigenados según su grupo funcional.
2. **Formular y nombrar** a los compuestos oxigenados aplicando la nomenclatura común y la sistemática.
3. **Identificar** las principales propiedades y aplicaciones de los compuestos oxigenados más resaltantes.

II. INTRODUCCIÓN

En las siguiente **muestras** de consumo cotidiano encontramos compuestos oxigenados:



El **anisado** es un buen digestivo



El **zumo del limón**, es un antioxidante orgánico:



La **piña** tiene un olor característico y agradable.

- El anisado es digestivo debido al **anisol** disuelto en **etanol**.
- El zumo de limón es un antioxidante orgánico debido al **ácido cítrico**.
- El olor agradable de la piña se debe al **butanoato de etilo**

Los nombres resaltados son compuestos orgánicos oxigenados, que serán estudiados, según los objetivos indicados.

III. FUNCIONES OXIGENADAS

3.1. CONCEPTO

Son compuestos covalentes ternarios constituidos por átomos de carbono, hidrogeno y oxígeno (**C,H,O**) donde el elemento **oxígeno** forma parte del grupo funcional; pueden ser naturales o sintéticos. Para comercializarlos se sintetizan industrialmente, incluso, a partir de hidrocarburos por petroquímica.

Ejemplo:

- Azúcar sacarosa:
 $C_{12}H_{22}O_{11}$
- El bioetanol:
 C_2H_5-OH
- El éter etílico:
 $C_2H_5-O-C_2H_5$

3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES OXIGENADAS

FUNCIÓN OXIGENADA	GRUPO FUNCIONAL	NOMBRE GRUPO FUNCIONAL	FORMULA GENERAL
Alcohol	- OH	Hidroxilo	R - OH
Éter	- O -	Oxi	$R_1 - O - R_2$
Aldehído	- CHO	Carbonilo	R - CHO
Cetona	- CO -	Carbonilo	$R_1 - CO - R_2$
Ácido Carboxílico	- COOH	Carboxilo	R - COOH
Éster	- COO -	Carboalcoxi	$R_1 - COO - R_2$




Donde: R , R_1 y R_2 son grupos sustituyentes

IV. ALCOHOLES

4.1. CONCEPTO


Son compuesto oxigenados que en su estructura tiene como grupo funcional al **hidroxilo** ($-\text{OH}$) unido al átomo de carbono de cuatro orbitales híbridos sp^3 .

Ejemplo: Los siguiente productos contienen alcohol




En su estructura se tiene: $\begin{array}{c} | \\ -\text{C}-\text{OH} \\ | \end{array}$ sp^3

Ejemplo Indique la estructura del alcohol



No es alcohol



Si es alcohol

4.2. FÓRMULA GENERAL



R- : grupo alquilo

Las moléculas de los alcoholes:

- son polares por el OH.
- se unen por EPH y FL.
- Si aumenta el # de C disminuye su polaridad.

4.3. NOMENCLATURAS: dos sistemas

A. Nomenclatura funcional o común

Alcohol nombre del sustituyente (R-) **ico**

Ejemplos:

$\text{CH}_3\text{—OH}$: alcohol metílico
(alcohol de madera)

$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$: alcohol etílico
(espíritu del vino)

$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$: alcohol propílico
(alcohol de carpintero)

$\text{CH}_3\text{—}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{—CH}_3$: alcohol isopropílico
(forma parte del ron de quemar)


B. Nomenclatura sistemática o IUPAC:

En el nombre del hidrocarburo, se cambia la terminación “o” por “ol”.

Ejemplos:


$\text{CH}_3\text{—OH}$: metanol $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$: etanol

Si el # de C ≥ 3 ,
la cadena principal se enumera por el extremo **más próximo** al hidroxilo —OH .



IUPAC 1979: 1-propanol

IUPAC 1993: propan-1-ol



IUPAC 1979: 2-propanol


IUPAC 1993: propan-2-ol

Los alcoholes, a partir del propanol presentan isómeros de posición, según la ubicación del —OH .

Nomenclatura sistemática o IUPAC de alcoholes de cadena ramificada y /o insaturado

Para la numeración de la cadena principal, el -OH tiene mayor jerarquía para llevar la menor numeración, respecto al grupo alquilo e insaturación (doble o triple enlace).


Ejemplo 1:



IUPAC 1979: 4- isopropil-6,6-dimetil-4-octanol

IUPAC 1993: 4-isopropil-6,6-dimetiloctan-4-ol

Ejemplo 2:



IUPAC 1979: 4-etil-4-metil-5-hexen-2-ol

IUPAC 1993: 4-etil-4-metilhex-5-en-2-ol





4.4. CLASIFICACIÓN DE LOS ALCOHOLES:

A. SEGÚN EL NÚMERO DE GRUPOS HIDROXILO (-OH)

▪ Monol

Poseen sólo **un hidroxilo** (-OH) en su estructura


Ejemplos:




▪ Poliol

Poseen **dos o más hidroxilos** (-OH) en su estructura, unidos a carbonos diferentes.


Ejemplos:



1,2-etanodiol (etanodiol)
(etilenglicol)



1,2,3 -propanotriol (propanotriol)
(glicerina)




IUPAC 1979: 1,2,4-pentanotriol

IUPAC 1993: pentan-1,2,4-triol

B. SEGÚN LA POSICIÓN DEL HIDROXILO (-OH) EN LA CADENA CARBONADA:

Alcohol primario	Alcohol secundario	Alcohol terciario
$R - CH_2 - OH$	$ \begin{array}{c} R - CH - R' \\ \\ OH \end{array} $	$ \begin{array}{c} R' \\ \\ R - C - R'' \\ \\ OH \end{array} $
$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - OH \\ \quad \quad \quad \nearrow 1^\circ \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ OH \\ \quad \quad \quad \nearrow 2^\circ \end{array} $	$ \begin{array}{c} OH \\ \\ \text{CH}_3 - C - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \quad \quad \quad \nearrow 3^\circ \end{array} $

Ejemplo:



Es un alcohol terciario

IUPAC 1979: 3-metil-5-hexin-3-ol

IUPAC 1993: 3-metilhex-5-in-3-ol

4.3. PROPIEDADES GENERALES DE LOS ALCOHOLES:

A. PROPIEDADES FÍSICAS:

- ✓ Los tres primeros alcoholes son muy solubles en el agua.
- ✓ Su solubilidad en el agua disminuye al incrementarse el # *de C*.
Ejemplo: n-butanol > n-hexanol.
- ✓ Su temperatura de ebullición aumenta al incrementarse el # *de C*.
Ejemplo: 2-butanol > 2-propanol
- ✓ Su viscosidad aumenta al incrementarse el # *de C*.
Ejemplo: n-pentanol > n-butanol
- ✓ Al aumentar el # de -OH se incrementa la temperatura de ebullición y la viscosidad.
Ejemplo: etanodiol > etanol

B. PROPIEDADES QUÍMICAS:

- ✓ Los alcoholes son **isómeros de función** de los éteres.
Ejemplo: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$ es isómeros con $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$
- ✓ El alcohol primario al oxidarse genera un **aldehído**.
Ejemplo: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH} \xrightarrow{[O]} \text{CH}_3\text{-CHO}$
- ✓ El alcohol secundario al oxidarse genera una **cetona**.
Ejemplo: $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_3 \xrightarrow{[O]} \text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$
- ✓ Identificación de los tipos de alcoholes según su reactividad química con el reactivo de Lucas ($\text{HCl} + \text{ZnCl}_2$).

Reactividad del alcohol:



V. ÉTERES

5.1. GRUPO FUNCIONAL : OXI ($\text{—}\ddot{\text{O}}\text{—}$).

5.2. FÓRMULA GENERAL:




- $\text{R} = \text{R}'$: éter simétrico
- $\text{R} \neq \text{R}'$: éter asimétrico.


Ejemplo:



Éter etílico o éter sulfúrico (anestésico)



- Se obtiene por reacción de deshidratación del alcohol:



5.3. NOMENCLATURAS: dos sistemas

A. Nomenclatura funcional o común

Sustituyente en orden alfabético (R-; R'-) **éter**

Ejemplos:

• $\text{CH}_3\text{—O—CH}_2\text{—CH}_3$ **Etilmetiléter**




• $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—O—CH}_2\text{—CH}_3$ **Dietiléter o éter etílico**
(éter sulfúrico)

• $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—O—}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{—CH}_3$ **etilisopropiléter**



B. Nomenclatura sistemática o IUPAC:

El radical con mayor # de C se nombra como un hidrocarburo y el radical menor pasa a ser un **radical oxi "R-O"**, lo cual se nombra como una rama o radical más del hidrocarburo.

Tenemos algunos radicales oxi "R-O-":



Ejemplos:



Las moléculas de los éteres:

- son polares,
- se unen por DD y FL.
- Si aumenta el # de C disminuye su polaridad.

5.4. PROPIEDADES GENERALES DE LOS ÉTERES

A. PROPIEDADES FÍSICAS:

- ✓ Son muy poco solubles en el agua.
- ✓ Su temperatura de ebullición es menor que la de un alcohol con igual # de C.
Ejemplo: n-butanol > éter etílico
- ✓ En volatilidad y presión de vapor: n-butanol < éter etílico

B. PROPIEDADES QUÍMICAS:

- ✓ Son muy estables no reaccionan fácilmente, por ello son utilizados como disolventes.
- ✓ Se queman con mayor facilidad que el alcohol con igual # de C y son más inflamables.

VI. ALDEHÍDOS

6.1. GRUPO FUNCIONAL: carbonilo (–COH).

6.2. FÓRMULA GENERAL:




Ejemplo:



El formol contiene
formaldehído



- Se obtiene al oxidar a un alcohol primario:



6.3. NOMENCLATURAS: dos sistemas

A. Nomenclatura funcional o común

Raíz común (# de C) **aldehído**

Ejemplo:

- H-CHO : **form**aldehído
- CH₃-CHO : **acet**aldehído
- CH₃-CH₂-CHO : **propion**aldehído
- CH₃-CH₂-CH₂-CHO : **butir**aldehído
- CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CHO : **valer**aldehído


B. Nomenclatura sistemática o IUPAC:

Se nombra cambiando la terminación “o” en el nombre del hidrocarburo correspondiente por la terminación “al”.

Si el aldehído es insaturado o tienen ramificaciones: la cadena principal se enumera iniciando por -CHO

Ejemplos:

- HCHO : metanal
- CH_3CHO : etanal
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$: propanal



4-etil-4,6,6-trimetilheptanal

6.4. PROPIEDADES GENERALES DE LOS ALDEHÍDOS:

A. PROPIEDADES FÍSICAS:

- ✓ Los cuatro primeros son solubles en agua y forman líquidos asociados “EPH” en la mezcla.
- ✓ Su temperatura de ebullición es menor que la de un alcohol con igual # de C.
Ejemplo: n-butanol > butanal
- ✓ Los de bajo peso molecular son de olor irritante y los siguientes son de olor agradable, otros inodoras






B. PROPIEDADES QUÍMICAS:

- ✓ Son buenos agentes reductores, forman **ácido carboxílico** al oxidarse.
- ✓ Por hidrogenación catalítica **se reduce**, obteniéndose el alcohol primario que le dio origen.

Ejercicio 1

EX.AD. UNI 2019 - 1

¿Cuál de los siguientes compuestos representa a un aldehído?



Resolución 1

Nos piden reconocer el compuesto que representa a un aldehído.


Respuesta:

Clave: D

VII. CETONAS

7.1. GRUPO FUNCIONAL : Carbonilo ($-\text{CO}-$)

7.2. FÓRMULA GENERAL :



- $\text{R} = \text{R}'$: simétrica
- $\text{R} \neq \text{R}'$: asimétrica


Ejemplo:



Es un eficaz quitamanchas y es muy utilizado para quitar el esmalte de las uñas.



- Se obtiene al oxidar un alcohol secundario:



alcohol 2°




cetona

7.3. NOMENCLATURAS: dos sistemas

A. Nomenclatura funcional o común

Radicales en orden alfabético ($\text{R}-$; $\text{R}'-$) **cetona**

Ejemplo:



B. Nomenclatura sistemática o IUPAC:


Se nombra cambiando la terminación “o” en el nombre del hidrocarburo correspondiente por la terminación “ona”.

Si el # de C ≥ 5 , para nombrar a la cetona se enumera la cadena principal iniciando por el extremo más próximo al carbonilo “-CO-”

Ejemplos:

$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$: propanona
(acetona)

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH}_3$: butanona



2-metil -3-pentanona

7.8. PROPIEDADES GENERALES DE LAS CETONAS:

A. Propiedades Físicas:

- ✓ La polaridad de molécula: **cetona > aldehídos** con igual # de C.
- ✓ Solubilidad en agua: **cetona > aldehído** con igual # de C.
- ✓ Si el # de C < 5: Teb cetona > aldehído.
de C ≥ 5 : Teb aldehído > cetona.

B. Propiedades Químicas:

- ✓ Son isómeros de función de los **aldehídos** y a partir de la pentanona tienen isómeros estructurales de posición y de cadena.
- ✓ Químicamente son más estables que los aldehídos, no se oxidan fácilmente.

Ejercicio 2

EX.AD. UNI 2020 - I

La acetona, $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$, se usa ampliamente como disolvente industrial. Al respecto, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

Número atómico: H=1; C=6; O=8

- I. La geometría alrededor del C del grupo carbonilo es plana trigonal.
- II. La acetona es un disolvente polar.
- III. Tiene una temperatura de ebullición mayor que la del 2-propanol.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| A) VVV | B) VVF | C) VFF |
| D) FVV | E) FFF | |

Resolución 2

Nos piden indicar V o F, respecto a la acetona

Analizamos la estructura de la acetona y las proposiciones dadas.


Respuesta: VVF

Clave: B

VIII. ÁCIDOS CARBOXILICOS

8.1. GRUPO FUNCIONAL: carboxilo ($-\text{COOH}-$)

8.2. FÓRMULA GENERAL:




R-: grupo alquilo o arilo

Ejemplo:



La ortiga es utilizada como relajante muscular
H-COOH

- Se obtiene al oxidar un aldehído:



aldehído

ácido carboxílico

8.3. NOMENCLATURAS: dos sistemas

A. Nomenclatura funcional o común

ácido Raíz común (# de C) **ico**

Ejemplos:

$\text{H}-\text{COOH}$: ácido **fórmico**
(ácido de hormiga)

CH_3-COOH : ácido **acético**
(es parte del vinagre)

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$: ácido **propiónico**

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$: ácido **butírico**

B. Nomenclatura sistemática o IUPAC:


Se nombra anteponiendo **ácido** luego en el nombre del hidrocarburo correspondiente la terminación “o” se cambia por “oico”.

Ejemplos:

H—COOH : ácido metanoico

CH₃—COOH : ácido etanoico

CH₃—CH₂—COOH : ácido propiónico



Ácido 4-etil-6,6-dimetilheptanoico

8.4. CLASIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS:

A. Mono carboxílicos (-COOH)



Poseen sólo **un** carboxilo (-COOH) en su estructura

Ejemplos:

H-COOH

CH₃-CH₂-COOH

CH₃-CH=CH₂-CH₂-COOH



B. Dícarboxílicos (-COOH)

Poseen **dos** carboxilos (-COOH) en su estructura

Ejemplos:

HOOC-COOH : Ácido etanodioico
(Ácido oxálico)

HOOC-CH₂-COOH : Ácido propanodioico
(Ácido malónico)

HOOC-CH=CH-COOH : Ácido 2-butenodioico

Al representar la geometría puede ser:


Ácido **cis**-2-butenodioico (**Acido maleico**)


Ácido **trans**-2-butenodioico (**Acido fumárico**)

C. Ácidos carboxílicos polifuncionales :

Poseen uno o más grupos funcionales unidos a la estructura carbonada del ácido carboxílico.

Ejemplos:


 : Ácido 2-hidroxipropanoico
(Ácido láctico)



Ácido 3-carboxi-3-hidroxipentanodioico
(Ácido cítrico)

También: Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico

8.5. PROPIEDADES GENERALES DE LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS:

A. Propiedades Físicas:

- ✓ Los tres primeros ácidos son líquidos de olor picante, los demás de olor desagradable(<10C).
- ✓ Los cuatro primeros ácidos son solubles en agua, al incrementarse el # *de C* disminuye su solubilidad.
Ejemplo: Solubilidad → ác. butirico > ác. Valerico
- ✓ Su temperatura de ebullición aumenta al incrementarse el # *de C*.
Ejemplo: Teb → ác. acético > ác. Fórmico
- ✓ Su temperatura de ebullición de los ácidos carboxílicos son mayores a los alcoholes con igual # *de C* por presentar mayor # de EPH.
Ejemplo: Teb → ác. acético > alcohol etílico

B. Propiedades Químicas:

- ✓ Los ácidos carboxílicos son ácidos débiles, su fuerza de acidez disminuye al aumentar el # de C.
Ejemplo: Fza acidez → $\text{H-COOH} > \text{CH}_3\text{-COOH}$
- ✓ Por reducción de un ácido carboxílico se genera un alcohol primario.
Ejemplo: $\text{CH}_3\text{-COOH} \xrightarrow{[\text{LiAlH}_4]} \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$
- ✓ Todo los ácidos carboxílicos reaccionan con los hidróxidos (reacción de neutralización) generando su respectiva sal.
Ejemplo:
 $\text{CH}_3\text{-COOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{-COONa} + \text{H}_2\text{O}$

IX. ÉSTERES

9.1. GRUPO FUNCIONAL : carboalcoxi ($-\text{COO}-$)

9.2. FÓRMULA GENERAL:



R; R':

Grupo alquilo o arilo

Ejemplo:

Los siguiente productos contienen ésteres

frambuesa




$\text{H-COO-CH}_2\text{-CH}_3$
(aroma de frambuesa)




$\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_3$
(olor de piña)

9.3. OBTENCIÓN POR ESTERIFICACIÓN:



Ejemplo:



Las moléculas de los ésteres:

- son polares.
- se unen por fuerzas DD y FL.
- Si aumenta el # de C disminuye su polaridad.
- La esterificación **no es** una reacción de **neutralización** ácido-base de Arrhenius.
- La reacción inversa será una **hidrólisis**.

9.4. NOMENCLATURAS: dos sistemas

A. Nomenclatura funcional o común


Raíz común (R-COO) **ato de Raíz (R'-)**ilo****

Ejemplos:

$\text{H-COO-CH}_2\text{-CH}_3$: formiato de etilo
(sabor a frambuesa, olor a ron)

$\text{CH}_3\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_3$: acetato de etilo
(olor a piña)


$\text{CH}_3\text{-COO-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$: acetato de isopropilo
(olor a pera)

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO-CH}_2\text{-}$  : Butirato de bencilo
(olor a rosa, sabor a pera)

B. Nomenclatura sistemática o IUPAC:

nombre del hidrocarburo(R-COO)ato** de Raíz (R'-)**ilo**.**

Ejemplos: $\text{H-COO-CH}_2\text{-CH}_3$: metanoato de etilo
 $\text{CH}_3\text{-COO-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$: etanoato de isopropilo



- Los **ésteres** son isómeros de función de los **ácidos carboxílicos**

X. COMPUESTOS POLIFUNCIONALES


Son compuestos que presentan dos o más grupos funcionales en su estructura molecular.

En este caso será necesario definir el grupo funcional principal que determinará la cadena principal y el orden de numeración de los carbonos que forman la cadena; los demás grupos funcionales se consideran como sustituyentes.


Aumenta la prioridad

Grupo funcional	SUFIXO (como grupo principal)	PREFIJO (como sustituyente)
—COOH	Ácido ... ico	... carboxi
—COO —	... ato de ...	... carboalcoxi
—CHO	... al	... formil
—CO —	... ona	... oxo
—OH	... ol	... hidroxil
$\begin{array}{c} \text{—C} = \text{C—} \\ \quad \end{array}$	... eno	...
$\text{—C} \equiv \text{C—}$	... ino	...


Ejemplos: Nombrar los compuestos



IUPAC: 4-metilhex-5-en-2-ol



IUPAC: 1-hidroxi-3-metilheptan-4-ona



IUPAC: ácido 3-etil-4-formil-6-hidroxi-3,5-dimetilheptanoico

XI. BIBLIOGRAFÍA

- ❑ Chang, R. y Goldsby, K. (2017). **Química**. México. McGraw Hill Interamericana Editores
- ❑ Plana de Química. *Química: análisis de principios y aplicaciones*. Tomo II, 1.a edición. Lima: Lumbreras Editores
- ❑ Brown T. L., H. Eugene L., Bursten B.E., Murphy C.J., Woodward P.M. (2014). **Química, la ciencia central**. México. Pearson Educación.
- ❑ Morrison, R. y Boyd, R. Química orgánica. 5.a edición. Addison-Wesley, 1990
- ❑ Petrucci R. H., Herring F. G , Madura J. D y Bissonnette C. **Química General** (2011). Décima ed. España. PEARSON EDUCACIÓN, S. A.

— ACADEMIA —

CÉSAR

VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe